

ПЕРЕЛІК
медикаментів, перев'язувальних засобів і приладдя
для надання першої долікарської допомоги

№ з/п	Найменування медичних засобів і медикаментів	Призначення	Кількість
1	Аміаку розчин 10 %, 40 мл	Застосовується для збудження дихання при втраті свідомості, запамороченні, шоку тощо (накапати на ватку 2-3 краплі, піднести до носу потерпілого)	1 фл.
2	Бинти марлеві - стерильний і нестерильний, 10 м x 5 см	Для накладання пов'язок для зупинки кровотеч, обмеження рухливості травмованих частин тіла, фіксації серветок. і т.п.	по 2 шт.
3	Болезаспокійливі засоби (анальгін, цитрамон тощо)	Болезаспокійливі засоби при болях різного походження (головна біль, невралгія, радикуліти, міозити), при забитих місцях, переломах, вивихах приймати по 1-2 таблетки 2-3 рази на день	1 уп.
4	Борної кислоти розчин спиртовий 2 % (3%), 10 (20) мл	Для промивання очей, примочок, прополіскування ротової порожнини	1 фл.
5	Брильянтового зеленого розчин спиртовий 1 %, 15 (20) мл	Застосовують зовнішньо як протимікробний засіб при дрібних пошкодженнях шкіри, при лікуванні гнійних ран, виразок і опіків, а також для обробки шкіри навколо поранених ділянок	1 фл.
6	Вазелін мазь, 20 (25) г	Для змащування шкіри при опіках 1-го ступеня, саднах, подразненнях	1 уп.
7	Валідол 0,06 № 10, таблетки	При сильних болях в області серця - по одній пігулці під язик до повного розсмоктування	1 уп.
8	Вата медична гігроскопічна стерильна	Для накладання пов'язок	100 г
9	Джгут кровоспинний гумовий	Для зупинки кровотечі при пораненнях. Накласти джгут вище рани, залишити записку із вказівкою часу накладення джгута (не можна тримати джгут більш години!), накласти на рану пов'язку (бинт, вата)	1 шт.
10	Йоду розчин спиртовий 5 %, 20 мл	Для обробки країв ран, подряпин на шкірі полоскання ротової порожнини при ангіні (3-4 каплі йоду на 100 мл теплої води)	1 фл.
11	Лейкопластир 0,05 x 5 м	Застосовують для фіксації різних видів пов'язок	1 шт.
12	Ножиці медичні	Для розрізання бинтів у процесі перев'язки	1 шт.
13	Перекису водню розчин 3 %, 25 (40) мл	Застосовують як дезінфікуючий засіб для промивання ран і для полоскання при стоматиті, ангіні (1 столова ложка розчину на склянку води).	1 фл.
14	Пінцет	Для медичних маніпуляцій	1 шт.
15	Пластир бактерицидний 2,3 x 7,2 см	Застосовують при дрібних пошкодженнях шкіри	5 шт.
16	Серветки марлеві медичні стерильні	Для накладення пов'язок і захисту ран від інфекцій.	2 уп.